

# SULFORMAX 750S

FERTILIZANTE

## EFECTO NUTRICIONAL EN EL METABOLISMO DE LA PLANTA

Producto a base de azufre con características multifuncionales. Posee efecto nutricional con papel estructural importante en el metabolismo de la planta, como la formación de aminoácidos formadores de las proteínas (metionina, cisteína y cistina), asimilación del Nitrógeno, síntesis de lípidos, polisacáridos, flavonoides, alcaloides, entre otros.



**Trigo, Soja, Girasol y Maíz:**  
1,5 L en cada aplicación

**Combinado**  
1 L de Fortune +  
1 L de Sulformax

Imagen sólo con fines ilustrativos.



**FORQUÍMICA**



**FORBIO**



forbio.ar  
argentina.forbio

# SULFORMAX 750S

Sulformax además de tener sustancias emolientes en su composición, no posee una granulometría uniforme intencionalmente para generar las siguientes funciones:

- Una fracción de SULFORMAX con granulometría menor, es absorbida rápidamente proporcionando efecto nutricional;
- Una fracción de SULFORMAX con una granulometría un poco mayor, no es absorbida y, rápidamente es reducida u oxidada en compuestos volátiles, que presentan olor fuerte característico con función repelente;
- Una última fracción de SULFORMAX tiene una granulometría un poco mayor al anterior, que va reaccionando, transformándose en compuestos volátiles con el tiempo, en función del tamaño de las partículas. Pues, este proceso ocurre por un tiempo prolongado y, consecuentemente, proporciona el efecto repelente por más tiempo.



## GARANTÍAS

P/P

P/V

N	TOTAL.....	1%	.....	15 g/L
S	.....	50%	.....	750 g/L

**! LEA LA ETIQUETA. AGITE EL PRODUCTO ANTES DE USAR.**

## RECOMENDACIONES TÉCNICAS

\*USAR LA CANTIDAD DE 100 L DE AGUA/ha

CULTIVOS	DOSIS (L/ha)	DILUCIÓN (*%)	ÉPOCA DE APLICACIÓN
SOJA, FRIJOL GIRASOL Y MAÍZ	1 A 2 L/ha	1% A 2%	REALIZAR 2 APLICACIONES. LA 1ª APLICACIÓN EN EL INICIO DE LA FLORACIÓN Y LA 2ª APLICACIÓN EN EL INICIO DE LA FORMACIÓN DE LAS VAINAS. APLICAR EN LAS ENTRELÍNEAS DE LOS CULTIVOS.
VID Y FRUCTÍFERAS	150 A 300 mL/100 L DE AGUA	0,15% A 0,3%	INICIAR EL TRATAMIENTO EN LA BROTAÇÃO. REPETIR LA APLICACIÓN POR 2 A 3 VECES CON INTERVALOS DE 30 DÍAS. APLICAR EN LAS ENTRELÍNEAS DE LOS CULTIVOS.
TRIGO	1,5 A 2 L/ha	1,5% A 2%	REALIZAR 2 APLICACIONES. LA 1ª APLICACIÓN DE 25 A 35 DÍAS DESPUÉS DE LA GERMINACIÓN Y LA 2ª APLICACIÓN ENTRE ENCAÑAZÓN Y EMISIÓN DE LAS ESPIGAS. APLICAR EN LAS ENTRELÍNEAS DEL CULTIVO.
SANDÍA Y MELÓN	1,5 A 2 L/ha	1,5% A 2%	REALIZAR APLICACIONES MENSUALES, APLICANDO EN LAS ENTRELÍNEAS DE LOS CULTIVOS.
ALGODÓN	1,5 A 2 L/ha	1,5% A 2%	REALIZAR 2 APLICACIONES. LA 1ª APLICACIÓN DE 60 A 80 DÍAS DESPUÉS DE LA GERMINACIÓN Y LA 2ª APLICACIÓN CON INTERVALO DE 30 DÍAS. APLICAR EN LAS ENTRELÍNEAS DEL CULTIVO.
CAFÉ	1,5 A 3 L/ha	1,5% A 3%	REALIZAR 3 APLICACIONES. OCTUBRE/DICIEMBRE/FEBRERO. APLICAR EN LAS ENTRELÍNEAS DEL CULTIVO.

**LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA ANTES DE USAR.**

**FORBIO**

**FORQUÍMICA®**

Empresas del **GRUPO FORUS**